

FICHE D'ALERTE

Detection du Groundnut Ring Spot Virus (GRSV) sur culture de laitue à Mayotte

◇ La maladie :



Le GRSV est un tospovirus qui affecte différentes cultures maraichères (tomate, laitue, aubergine, poivron). Les symptômes entraînent un dépérissement des feuilles avec nécrose des nervures. Il convient d'être vigilant car ceux-ci peuvent être confondus avec un autre tospovirus, le Tomato spotted wilt Virus (TSWV). Cette virose est véhiculée par les thrips. Plus l'attaque est précoce et plus les symptômes seront sévères.



◇ Moyens de prévention :



Comme évoqué précédemment, le virus est transmis par les thrips. Installer des panneaux englués de couleur bleue dans sa parcelle permet de piéger ces ravageurs et donc de limiter leur impact. Veillez à désherber les abords du champ afin d'éliminer des sources de virus et/ou de vecteurs. Arracher rapidement les premiers plants atteints ou votre culture en fin de cycle si celle-ci est contaminée.

DAAF, Service Alimentation : 0269 61 11 41
Lycée agricole de Coconi
Animateur inter-filière : Bryce BOUVARD - EPN- 0639 60 80 81,
mail = bryce.bouvard@hotmail.fr/bryce.bouvard@educagri.fr

