

Cultures vivrières



Banane

Résumé :

Les charançons sont largement répandus sur le territoire. Les pièges relevés par le CIRAD montrent une présence continue de cet organisme depuis la mise en place du maillage de piège.



Cercosporiose



Charançons



FOC TR4



Point sur la situation FOC

Rappel des symptômes : Striures jaunes débutant à l'extrémité des feuilles, ou, à un stade plus avancé : feuilles tombantes entièrement jaunies.

Attention à la qualité sanitaire et l'origine des rejets sélectionnés, cette maladie se propage rapidement.

Contactez l'unité Santé Protection des Végétaux de la DAAF (**02.69.64.50.42**) en cas de doute.

Maïs

Résumé :

Ce mois-ci, aucune parcelle de maïs n'a pu être observée en culture. En cas de plantation, n'hésitez pas communiquer vos observations.



Chenilles légionnaires



Pucerons



Manioc

Résumé :

La perte progressive du feuillage des plants de manioc engendre une diminution de la pression/de l'observation des ravageurs aériens. De même, les symptômes du CBSV sont plus difficiles à noter.


Virus de la mosaïc - CMV



Tigre du manioc



Cochenilles



Virus de la striture brune - CBSV



Aleurodes



Acariens



Cercosporiose

