

# Cultures vivrières



# Banane

Résumé :

Un nouveau foyer de FOC TR4 a été identifié dans la zone de Kaweni récemment. Le partage de rejet est donc à surveiller particulièrement. En cas de doute, merci de contacter le service de la **DAAF SALIM - Unité Santé & Protection du Végétal**.



Cercosporiose



Charançons



FOC TR4



## Point sur la situation FOC

Rappel des symptômes : striures jaunes débutant à l'extrémité des feuilles, ou, à un stade plus avancé : feuilles tombantes entièrement jaunies.

Attention à la qualité sanitaire et l'origine des rejets sélectionnés, cette maladie se propage rapidement.

Contactez l'Unité Santé Protection des Végétaux de la DAAF (**02.69.64.50.42**) en cas de doute.

p.15

# Maïs

Résumé :


Des attaques de chenilles légionnaires ont été observées au cours de ce mois d'octobre. Les méthodes de protection face à ce bioagresseur majeur sont multiples et doivent être croisées pour maximiser les chances de préservation de la culture.



Chenilles légionnaires



Pucerons



# Manioc

Résumé :

Pour la première fois depuis longtemps, des plants de manioc observés dans le centre de l'île semblent présenter des traces d'attaques d'acariens. Ponctuation plus fine des piquées et jaunissement des parties piquées sont les principaux symptômes visibles.

Virus de la mosaïc - CMV



Tigre du manioc



Cochenilles



Virus de la striture brune - CBSV



Aleurodes



Acariens



Cercosporiose

